



REGULAMENT SI PROTOCOL PENTRU PACIENTI SI PERSONAL

CLINICA LYRDENT

IN VEDEREA PREVENTIEI SI COMBATERII INFECȚIEI

CU SARS-CoV2 (COVID-19)

Valabil incepand cu data de 15.05.2020

In contextul actual al pandemiei cu virusul **SARS-CoV2 (COVID-19)**, Clinica LYRDENT a decis elaborarea prezentului regulament si protocol atat pentru pacienti cat si pentru personalul clinicii. Acesta va fi pus la dispozitia pacientilor prin intermediul site-ului <https://clinicalyrdent.ro/covid-19> precum si prin email sau in varianta tiparita la sediul clinicii din Sos. Orhideelor nr. 19, sc. B, parter, Bucuresti Sector 6.

Capitolul 1 – Programarea si Triajul pacientilor si pasii de urmat in urma programarii telefonice

Capitolul 2 – Protocol acces pacient in incinta clinicii si acces in sala de tratament (inclusiv completare fise, plata serviciilor medicale si parasirea clinicii)

Capitolul 3 – Protocol asezare pacient pe scaun si pregatirea premergatoare tratamentului

Capitolul 4 – Protocol decontaminare sala tratament

Capitolul 4 - Protocol acces personal medical si auxiliar

Capitolul 5 – Protocol medici si asistente echipare/dezechipare

Capitolul 6 – Protocol sterilizare instrumentar si decontaminare sala de tratament si holuri acces la final de program



CAPITOLUL 1 - PROGRAMAREA SI TRIAJUL PACIENTILOR

Avand in vedere contextul actual, cat si intreruperea activitatii ca urmare a instituirii starii de urgenta, pacientii ce aveau programari incepand cu data de 16.03.2020 si pana in prezent, vor avea prioritate fata de noii pacienti precum si eventualele urgente.

Programarea pacienților cu risc crescut (peste 65 de ani sau cei care suferă de o patologie cronică), care nu sunt simptomatici se va face, cu prioritate, la începutul programului (pentru a se limita expunerea la alți pacienți).

Programarea unei interventii stomatologice la Clinica Lyrdent se poate face prin urmatoarele mijloace:

- Telefonice – de luni pana vineri in intervalul orar 10.00 – 19.30 la numerele de telefon +4.0722.518.617 sau +4.0740.903.931.
- Email – 24/24 la adresa contact@lyrdent.ro (timp de raspuns maxim 2 ore in intervalul orar 10.00 – 19.30)
- Prin intermediul formularului de contact aflat pe site-ul <https://clinicalyrdent.ro> (timp de raspuns maxim 2 ore in intervalul orar 10.00 – 19.30)

In situatia in care se opteaza pentru programarea prin modalitatile online, pacientul va fi apelat in cel mai scurt timp posibil pentru a putea stabili data si ora programarii cat si pentru obtinerea informatiilor necesare.

Se recomanda, in cazul pacientilor noi, ca acestia sa efectueze prelabil o radiografie panoramica OPG sau Computer tomograf – CT, pentru a limita numarul vizitelor si implicit al programarilor.

Pacienții confirmați cu COVID-19 vor fi direcționați către cabinete stomatologice care îndeplinesc condițiile pentru tratarea acestora sau vor fi programati dupa ce acestia vor putea dovedi faptul ca nu mai sunt COVID-19 pozitiv.



Programarea pacienților simptomatici, dar neconfirmați COVID-19, va fi temporizată pentru minim 14 zile de la data respectivă, cu condiția să nu mai prezinte simptome specifice.

În cadrul apelului telefonic, pacientul va furniza informațiile necesare atât cât privește afecțiunea stomatologică pentru care solicită programare, cât și despre starea generală a sănătății. Pacientul va furniza, de asemenea, toate informațiile necesare evaluării riscului de răspândire a virusului Covid -19.

Ulterior programării, pacientul va intra pe pagina de internet <https://clinicalyrdent.ro/covid-19> unde va completa formularul necesar.

De asemenea, acesta va completa online fișa pacientului. Acest formular, cât și fișa pacientului vor fi tipărite de către personalul clinicii, pacientul semnând fiecare pagină la sosirea în clinică.



CAPITOLUL 2 – PROTOCOL ACCES PACIENT IN INCINTA CLINICII (inclusiv completare fise, plata servicii medicale si parasirea clinicii)

Pacientul se va prezenta, fara insotitor (ce exceptia cazurilor in care persoana necesita insotitor) in fata imobilului din Sos. Orhideelor nr. 19, sc. B, Bucuresti Sector 6, cu cel mult 10 minute inaintea orei la care a fost programat.

Acesta va informa telefonic personalul clinicii. In acel moment, pacientul va fi inregistrat in asteptare. In cazul in care interventia anterioara implica o decalare a programului, pacientul va fi informat si acesta va astepta in afara clinicii pana cand va fi chemat.

Dupa ce pacientul informeaza clinica de sosirea sa, acesta va astepta apelul telefonic pentru a putea intra in sediul clinicii.

Este interzisa prezenta a mai mult de 2 pacienti in clinica in acelasi timp.

La intrarea în cabinetul stomatologic pacientul și, dacă este cazul, însoțitorul, nu va atinge mânerele ușilor, suprafețele meselor, scaunelor etc.

Ușile vor fi deschise și apoi închise de către personalul medical; aceeași procedură se va respecta și la intrarea/ieșirea din sala de tratament.

Asistenta urmareste intreg traiectul pacientului de la accesul in cabinet si sterge periodic toate suprafetele atinse de pacient de la intrarea in clinica si pana ajunge in sala de tratament si pe traseul invers (clante, scaun, robinet, POS, blat receptie, etc.) cu solutii pe baza de alcool (>70%) sau pe baza de hipoclorit de sodiu (min. 0,1%).

Pacientul dupa ce intra in clinica, va urma urmatorul protocol:

- Se va sterge pe picioare pe covorul special imbibat in solutie dezinfectanta.
- Se dezinfecteaza pe maini cu solutia pusa la dispozitie de catre clinica pe peretele de langa usa (in partea stanga).
- Va folosi acoperitorii de pantofi pusi la dispozitie.
- Pacientul isi va lasa haina si alte obiecte personale in dulapul - vestiar disponibil in sala de asteptare, intr-un sac ce i se va pune la dispozitie – cheia va ramane la pacient.



- I se ofera punga cu echipamentul de protectie necesar – masca, manusi, boneta precum si un pix pe care pacientul il va pastra.
- Va intra in grupul sanitar pentru a se spala pe maini. Regulile pentru spalarea eficienta a mainilor vor fi afisate in grupul sanitar.
- La iesirea din grupul sanitar, pacientul se va echipa sub supravegherea personalului clinicii.
- Pacientului i se va lua temperatura, valoarea fiind inregistrata in fisa acestuia.
 - o daca temperatura este sub 37,5 grade C pacientul, dupa caz, insotitorul, atunci programarea se va respecta intocmai;
 - o daca temperatura este peste 37,5 grade C, se reia masurarea acesteia si daca valoarea se mentine, se va renunta la programare, se va temporiza tratamentul si pacientul va fi monitorizat telefonic; in cazul insotitorului, medicul stomatolog va decide asupra conduitei adoptate.
- Pacientul va lua loc pe scaunul indicat de catre personalul clinicii.
- Va semna si completa formularele necesare puse la dispozitie de catre personalul clinicii. Toate formularele semnate de catre pacient vor fi introduse intr-o foaie de protectie transparenta ce va fi stearsa cu servetele dezinfectante.
- Dupa terminarea tratamentului, pacientul va fi invitat in sala de asteptare, pentru ca medicul curant sa-i poata completa fisa si eventual indicatiile de urmat ulterior. Toate aceste informatii vor fi oferite de personalul clinicii, medicul curant ramanand in sala de tratament. Orice alte informatii pot fi obtinute ulterior telefonic.
- Pacientul va fi informat de costul tratamentului pe care il va achita la receptia clinicii pastrand o distanta de siguranta.
- Inainte de parasirea clinicii, pacientul isi va da jos boneta, protectia pantofilor, manusile si masca – doar in aceasta ordine, pe care le va amplasa in cosul de deseuri indicat.
- Pacientul va parasi clinica. In cazul in care pacientul are intrebari suplimentare, acesta va apela clinica telefonic, fiind interzisa ramanerea in holul clinicii pentru o perioada mai lunga de timp fara un temei justificat.



CAPITOLUL 3 – PROTOCOL ASEZARE PACIENT PE SCAUN SI PREGATIREA PREMERGATOARE TRATAMENTULUI

Asistenta indruma pacientul catre sala de tratament atribuita, fiind la 1.5 m distanta fata de pacient.

Asistenta merge inaintea pacientului, care o urmeaza.

Pacientul intra in cabinet, se asezaza pe scaun si este echipat de catre asistenta conform protocolului uzual de lucru in cabinet.

Pacientul isi scoate masca.

Pacientul clateste cu H₂O₂ (diluata 1%) sau Clorhexidină 2% sau Iso-Betadină (recomandat până la 2 minute) conform normativelor impuse de CMDR.

Pacientului ii este realizata anamneza de catre medic, dupa care are loc evaluarea clinica.

Pacientului i se intocmeste Plan de Tratament, care i se aduce la cunostinta verbal in prima faza de catre medic si imediat urmator in forma printata.

Pacientul semneaza Planul de Tratament si Acordul Informat pentru realizarea tratamentului.

Dupa ce pacientul finalizeaza tratamentul **clateste gura cu H₂O₂ (diluata 1%) sau Clorhexidină 2% sau Iso-Betadină (recomandat până la 2 minute).**

Pacientului ii este decontaminata fata cu servetele umede.

Pacientul se ridica si se realizeaza dezechiparea acestuia.

Pacientul paraseste sala de tratament.



Recomandari pentru medici in vederea reducerii riscului de contaminare:

- ***dacă se folosește instrumentarul rotativ se recomandă setarea debitului apei la minimul necesar;***
- ***dacă se utilizează instrumentar rotativ: sterilizare completă a pieselor înainte de reutilizare (autoclav) sau utilizați piese de unică folosință;***
- ***utilizarea unei aspirații eficiente;***
- ***oricând este posibil, se recomandă folosirea sistemului de izolare cu digă, acesta reduce semnificativ proiecția picăturilor de salivă;***
- ***dacă este necesară sutura, se recomandă utilizarea unui fir resorbabil;***
- ***pentru a limita expunerea medicului stomatolog este recomandat ca acesta să stea în spatele pacientului.***

Tot instrumentarul necesar va fi scos in prealabil si verificat de catre medic pentru a evita deschiderea sertarelor sau a dulapurilor in timpul procedurilor.

NU SE VA PARASI INCAPEREA IN TIMPUL PROCEDURILOR!



CAPITOLUL 4 – PROTOCOL DECONTAMINARE SALA TRATAMENT (inclusiv instrumentar)

Dezinfectarea si sterilizarea spatiilor de lucru si a spatiilor comune se face folosind aparate (nebulizator, lampa UV) si substante care sa asigure maximul de eficienta in conditiile epidemiologice actuale. Clinica Lyrdent foloseste echipamentul de nebulizare pentru sterilizarea aeromicroflorei in conformitate cu dispozitiile legale actuale.

Acolo unde este posibil, se recomandă acoperirea suprafețelor cu o folie de polietilenă. Aceasta folie va fi îndepărtată și înlocuită în funcție de intervențiile ce au fost efectuate în sala de tratament.

După finalizarea tratamentului, instrumentarul folosit se așază în soluție SEKUSEPT AKTIV – diluție 2%, pentru 75 minute.

Se deschide geamul pentru a asigura aerisirea corespunzătoare a încăperii.

Medicul se dezechipează (a se vedea capitolul 5) și părăsește încăperea. Toate reziduurile sunt aruncate în cosul cu sac de culoare galbenă, acesta urmând a fi depozitat în spațiul special până la ridicarea de către societatea specializată.

Chiuveta unit-ului se dezinfectează cu soluție specială de aspirație (NU CLOR!!!). Pentru dezinfectarea scaunului și a suprafețelor se folosește soluția specială de suprafețe MIKROZID AF Liquid sau MIKROBAC forte.

Piesa contraunghi, turbina, piesa de detartraj și orice alt instrumentar se dezinfectează și se lasă impaturite în servetele imbibate în soluție. Înainte de pregătirea salii pentru următorul pacient, se ung piesele ce necesită această operațiune.

Se lasă substanțele să acționeze după care se șterg cu servetele de hârtie (rolă). Toate resturile de hârtie se aruncă în cosul cu sac de culoare galbenă.

Se activează unitatea cu UV în perioada în care nu este nimeni prezent în camera.



Se inchide geamul si se procedeaza la dezinfectia aeromicroflorei, utilizand nebulizatorul ULV, PR 100 cu dezinfectantul STERISOL Dezinfectant de nivel inalt RTU 5000 ml concentratie 2% timp de 15 min. Se asteapta 30 de minute.

Dupa trecerea acestui interval, asistenta va proceda la inlaturarea oricaror deseuri ramase si va relua procedura de dezinfectie folosind dezinfectantii mai sus amintiti.

Se deschide geamul si se va pregati sala de tratament pentru urmatorul pacient.

Se aplica folie albastra de protectie pe manere, dupa ce cabinetul este steril, asistenta purtand manusi noi.

Se activeaza unitatea cu UV intre schimburile de tura, plus seara la final de tura, dupa ce se face ciclul de sterilizare mentionat mai sus.



CAPITOLUL 4 - PROTOCOL ACCES PERSONAL MEDICAL SI AUXILIAR

Accesul personalului medical si auxiliar, cat al partenerilor (curieri, furnizori) se va face cu respectarea regulilor descrise la capitolul 2 - Igienizarea mainilor, acoperitori, temperatura.

Tot personalul poarta masca chirurgicala in incinta clinicii. Inainte de plecare spre domiciliu primeste o masca chirurgicala noua.

Astfel, personalul clinicii va respecta urmatorul protocol la intrarea in clinica:

- Se va sterge pe picioare pe covorul special imbibat in solutie dezinfectanta.
- Se dezinfecteaza pe maini cu solutia pusa la dispozitie de catre clinica pe peretele de langa usa.
- Va folosi acoperitorii de pantofi pusi la dispozitie.
- Va intra in grupul sanitar pentru a se spala pe maini.
- I se va lua temperatura si va primi masca si manusi.
- Se va indrepta catre vestiar urmand a se schimba si echipa cu costumul de lucru.

Vizitatorii, cat si partenerii, vor urma protocolul descris mai sus in conformitate cu instructiunile personalului clinicii.

Se va evita contactul cu pacientii si se va pastra distanta minima de 1,5 m fata de interlocutor.

Se va evita intrarea in sala de tratament de catre personalul auxiliar in momentul desfasurarii procedurilor stomatologice. Se vor folosi mijloacele de comunicare mobila sau se va astepta pana la finalizarea tratamentului si dezinfectarea spatiului.

Documentele (facturi, foi parcurs, etc.) se vor inmana personalului clinicii in locurile si in modalitatea indicata la momentul respectiv. In cazul in care stationarea in holul clinicii va depasi 2 minute, OBLIGATORIU se va folosi masca faciala pusa la dispozitie de catre clinica.



CAPITOLUL 5 – PROTOCOL MEDICI SI ASISTENTE ECHIPARE/DEZECHIPARE

Echipamentul individual de protecție (PPE) trebuie utilizat pe baza riscului de expunere și a dinamicii de transmitere a agentului patogen:

Astfel, personalul auxiliar cat si personalul medical ce intra în contact direct cu pacientii, în afara salii de tratament, vor purta urmatorul echipament:

- mască simplă;
- halat impermeabil de unica folosință;
- capelină/bonetă de unică utilizare;
- mănuși de unică utilizare (nesterile);

Personalul medical care intra în contact direct cu pacienții în sala de tratament va purta urmatorul echipament de protecție:

- mască de protecție respiratorie - N95 sau FFP2 standard, sau echivalent
- halat impermeabil si sort de unică folosință;
- capelină/bonetă de unică utilizare;
- mănuși de unică utilizare (nesterile);
- protecția ochilor (ochelari sau ecran de protecție facială).

Personalul medical care realizează proceduri generatoare de aerosoli la pacienti va purta urmatorul echipament de protecție:

- mască de protecție respiratorie - N95 sau FFP2 standard, sau echivalent;
- halat impermeabil de unică folosință/combinezon;
- capelină/bonetă de unică utilizare;
- mănuși de unică utilizare (nesterile) – 2 randuri;
- protecția ochilor (ochelari sau ecran de protecție facială).

Echiparea MEDICULUI/ASISTENTEI






- Se scot din buzunare chei, telefon, bani etc.
- Se spala mainile cu apa, sapun si dezinfectant;
- Se imbraca halatul chirurgical sau combinezonul si primul rand de manusi.

In aceasta faza NU se trage fermoarul pana sus si nu se pune gluga! Fara sa ai in picioare incaltari!

Primul rand de manusi ramane sub halat/combinezon!

- Se incalta cizmele din PVC cu combinezonul sub cizme.
- Se pune masca.
- Se pun ochelarii.
- Se pune viziera
- Se pune gluga peste cap.
- Se inchide fermoarul combinezonului pana la capat.
- Se verifica combinezonul prin cateva miscari de extindere ale mainilor si picioarelor, astfel incat acesta sa nu fie blocat, existand riscul ruperii.
- Se pune a doua pereche de manusi, de aceasta data PESTE COMBINEZON!

ECHIPAREA CU ECHIPAMENTUL DE PROTECTIE (PPE)

1 SE SCOT DIN BUZUNARE CHEI, TELEFON, BANI ETC. 	2 SE IMBRACA HALATUL DE MEDIC/ASISTENT 	3 INDREPTATI-VA CATRE SALA DE TRATAMENT 4 VERIFICATI INTEGRITATEA ECHIPAMENTULUI SI DIMENSIUNEA MANUSILOR 5 INCEPETI PROTOCOLUL DE ECHIPARE IN PREZENTA UNUI COLEG	6 SPALATI-VA PE MAINI 
7 PUNETI PRIMUL SET DE MANUSI DE UNICA FOLOSINTA 	8 IMBRACATI COMBINEZONUL 		
9 PUNETI MASCA DE PROTECTIE 	10 PUNETI VIZIERA SAU OCHELARI DE PROTECTIE OR  OR 		
12 PUNETI A DOUA PERECHE DE MANUSI ATENTIE SA ACOPERE MANSETA COMBINEZONULUI 			

Dezechiparea MEDICULUI/ASISTENTEI

- Se dezinfecteaza mainile acoperite de manusi cu gel dezinfectant.
- *Dispenserul pentru dezinfectant va fi actionat de catre asistenta/alta persoana, pentru a evita contaminarea dispenserului.*
- Asistenta pulverizeaza pe tot costumul MIKROZID AF .
- Se scoate primul rand de manusi si se arunca in recipientul cu sac galben pentru deseuri biologice.
- Se dezinfecteaza mainile acoperite de manusi cu gel dezinfectant.
- Se scoate gluga rulandu-se spre spate si se deschide fermoarul pana la jumatate si apoi se scoate combinezonul pe dos cu miscari lente, pentru a nu face aerosoli.
- Se dezinfecteaza mainile acoperite de manusi cu gel dezinfectant.
- Se scot cizmele si apoi se indeparteaza combinezonul.
- Se dezinfecteaza mainile acoperite de manusi cu gel dezinfectant.
- Combinezonul se strange usor si se arunca in recipientul cu sac galben pentru deseuri biologice.
- Se dezinfecteaza mainile acoperite de manusi, din nou cu atentie fara a atinge dispenserul.
- Se scoate viziera/ochelarii.
- Se dezinfecteaza mainile acoperite de manusi cu gel dezinfectant.
- Se indeparteaza al doilea rand de manusi, scotandu-se pe dos si se arunca in recipientul cu sac galben pentru deseuri biologice.
- Se igienizeaza mainile prin spalarea cu apa si sapun si apoi aplicarea de dezinfectant.
- Se paraseste zona contaminata si se scoate masca de protectie.
- Se igienizeaza mainile prin spalarea cu apa si sapun.

La sfârșitul zilei de lucru, personalul medical nu va părăsi cabinetul cu nici unul din echipamentele folosite; la domiciliu pantofii vor fi dezinfectați iar hainele vor fi spălate



separat de cele ale celorlalți membri ai familiei, proceduri urmate imediat de igienizare corporală (duș).

DEZEECHIPAREA ECHIPAMENTULUI DE PROTECTIE (PPE)

1

INLATURATI PRIMUL SET
DE MANUSI.
PRINDETI SI RULATI
PRIMA MANUSA



INTRODUCETI UN DEGET SUB
CEALALTA MANUSA SI RULATI
SPRE EXTERIOR CU ATENTIE SA
NU ATINGENTI ZONA
CONTAMINATA



IGIENIZATI
MAINILE



2

INDEPARTATI COMBINEZONUL URMAND INSTRUCTIUNILE PRIMITE



3

IGIENIZATI
MAINILE



4

INDEPARTATI OCHELARI SI SAU VIZIERA

OPERATIUNEA SE VA
EFECTUA USOR
INCLINAT IN FATA



5

INLATURATI MASCA FFP2
ATENTIE!
NU ATINGETI MASCA
INDEPARTATI MASCA DIRECT IN
COSUL CU DESEURI APLECAT USOR
IN FATA.



6

IGIENIZATI
MAINILE





CAPITOLUL 6 – PROTOCOL STERILIZARE INSTRUMENTAR SI DECONTAMINARE SALA DE TRATAMENT SI HOLURI ACCES LA FINAL DE PROGRAM

1. Sterilizare sala tratament la final de program

- Se aplica protocolul prevazut la Capitolul 4.
- Se deschide geamul. Se deschid toate sertarele
Se aplica dezinfectant pe unit/ scaun medic, scaun asistenta.
- Se aplica dezinfectant pe piese (turbina, contraunghi, spray aer/apa)
- Se aplica dezinfectant pe cosurile de gunoi biologic.
- Se aplica dezinfectant pe usa intrare/ clanta inclusiv pe exteriorul usii.
- Se porneste lampa UV si se lasa timp de 15 minute.

Sala de tratament si holul se decontamineaza cu nebulizatorul ULV, PR 100 cu dezinfectantul STERISOL Dezinfectant de nivel inalt RTU 5000 ml concentratie 2% timp de 15 min. Se asteapta 30 de minute.

Se asteapta 60 de minute si se procedeaza la dezinfectia cu MIKROZID AF si stergerea suprafetelor.

Se aplica folia albastra de protectie si se aseaza in ordine instrumentarul.

Pregatirea pentru ziua de lucru urmatoare se efectueaza la prima ora dupa ce, in prealabil, se porneste lampa UV, timp de 15 minute.

2. Sterilizare instrumentar

1. Pre-dezinfectie (Decontaminare)

Imediat după utilizare, instrumentarul mare se imersează în soluție Sekusept Aktiv – diluție 2% - într-o cuvă cu capac, iar cel mărunț în cutia mică rotundă prevăzută cu sită, timp de 15 minute.

În cuvă se utilizează produsul de sterilizare la rece, schimbat zilnic sau mai des la nevoie (grad crescut de contaminare).

Pe capacul cuvei sunt inscripționate: numele dezinfectantului, concentrația de lucru, timp de acțiune, data preparării, valabilitate soluție (o zi).

2. Clătire – sub jet de apă caldă. Clătirea se face din abundență, pentru a îndepărta orice urmă a detergentului dezinfectant.

3. Curățarea mecanică: Manual.

Operatorul poartă obligatoriu mănuși groase, mască, ochelari de protecție. Se utilizează perii de forme și mărimi adecvate, într-o tăviță cu dezinfectant-detergent.

Sunt periate atent toate zonele instrumentelor, cu precădere locurile retentive (ex: lamele frezelor).

4. Clătirea finală a instrumentelor

Se realizează după curățarea manuală.

5. Dezinfectie finală

În cazul instrumentarului autoclavabil ce a fost curățat manual se va realiza această dezinfectie finală într-o cuvă cu capac rezervată acestui scop. Se utilizează soluția Gygazime – diluție 1% - timp de acțiune 15 minute.

Pe capacul cuvei sunt inscripționate: numele dezinfectantului, concentrația de lucru, timp de acțiune, data preparării, valabilitatea soluției.

Se scoate instrumentarul și se clătește.

6. Uscare-inspecție

Se realizează cu prosoape curate special rezervate acestui scop, de unică utilizare.

Instrumentarul va fi inspectat și cel cu urme de deteriorare va fi aruncat (ex: ace de canal despiralate, freze tocite, etc.)



Dacă se observă urme de ciment sau alți contaminanți se va relua curățarea manual.

7. Lubrefiere. Se realizează dacă e cazul (turbine, piese cot) cu sprayul lubrifiant.

8. Ambalarea în vederea sterilizării.

- trusele și instrumentarul chirurgical se ambalează individual în pungi de hârtie-plastic speciale și se sudează.
- instrumentarul divers se sortează și se asează în casonetele metalice inscripționate (dacă este cazul).
- se pregătesc kituri de ace și freze (în cutiile speciale) pentru diferite tipuri de manopere sau ambalate individual în pungi de hârtie-plastic sudate.

9. Sterilizarea propriu-zisă

Se realizează la autoclav, alegând unul din ciclurile presetate corespunzătoare materialelor introduse. CICLU DE 134 grade C, 18 min.

Pe casonete se lipește o bandă de hârtie indicator fizico-chimic pe care se notează data, ora, și semnătura.

Durata menținerii sterilității materialelor ambalate în cutii metalice perforate/casonete cu colier este de 24 de ore de la sterilizare, cu condiția menținerii acestora închise.

Pe fiecare pungă hârtie-plastic se notează data sterilizării și/sau data expirării. Pungile se numerotează în vederea asigurării trasabilității. Marcajele pe pungă se fac în afara zonei de sudare, pentru a nu periclita siguranța pachetului.

Durata menținerii sterilității în pungile hârtie-plastic sudate este de 2 luni de la sterilizare, cu condiția menținerii integrității ambalajului.



ANEXE

1. FORMULAR INFORMARE PACIENT COVID – 19;
2. FISA PACIENT ON LINE.
3. CUM SPALAM MAINILE



ANEXA 1

Formular obligatoriu COVID - 19

NUME SI PRENUME

DATA DE NASTERE

EMAIL

TELEFON

1. Ați locuit / vizitat zone în care se aflau persoane suferind din cauza infecției cu SARS-CoV2 (COVID-19) în ultimele 14 zile?

- DA
- NU

Daca DA, va rugam sa precizati zona

2. Ați venit în contact direct cu persoane suferind din cauza infecției cu Coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19) la serviciu, în vecinătatea locuinței sau vizitând unități medicale ori alte genuri de locuri în ultimele 14 zile?

- DA
- NU

3. Ați fost spitalizat în ultimele trei săptămâni?

- DA
- NU

4. Ați avut una sau mai multe dintre următoarele simptome?

- FEBRA
- DIFICULTATEA DE A INGHIȚI
- DIFICULTATEA DE A RESPIRA
- DURERI MUSCULARE
- TUSE INTENSĂ
- NICIUNA DE MAI SUS

Am luat la cunostinta de faptul ca nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase se sanctioneaza conform Art 352 - Zădărnicierea combaterii bolilor – din Codul Penal si a art. 34 lit m) din HG nr. 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contravențiilor la normele din domeniul sanatatii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

- CONFIRM

TRIMITE



ANEXA 2

FISA PACIENT CLINICA LYRDENT

NUME SI PRENUME

DATA DE NASTERE

EMAIL

TELEFON

CHESTIONAR DE EVALUARE A STARII GENERALE. Certific și declar că datele furnizate de mine în acest chestionar sunt reale și complete. Îmi asum întreaga responsabilitate pentru incidente sau complicații ce pot să apară în eventualitatea că aceste date sunt false sau incomplete.

- CONFIRM
- DORESC SA RENUNT LA COMPLETAREA FORMULARULUI ONLINE

1. Suferiți de alergii sau intoleranțe medicamentoase sau nemedicamentoase?

- DA
- NU

Dacă răspunsul este afirmativ, precizați la ce anume

2. Urmăți un anumit tratament (medicamentos, homeopatic, fitoterapic etc.)?

- DA
- NU

Dacă răspunsul este afirmativ, precizați medicamentul/produsul și doza administrată

3. Ați urmat tratament cu antibiotice în ultimele două săptămâni?

- DA
- NU

Dacă răspunsul este afirmativ, precizați medicamentul/produsul și doza administrată

4. Urmăți tratament cu anticoagulante?

- DA
- NU

Dacă răspunsul este afirmativ, precizați medicamentul și doza administrată și ultima valoare INR.

5. Urmăți tratament cu: Fosamax, Fosavance, Actonel, Bonviva, Zometa, Aclasta (bifosfonați)?

- DA
- NU

Dacă răspunsul este afirmativ, precizați: medicamentul și doza administrată, calea de administrare - intravenoasă sau orală, de cât timp urmați acest tratament (luni/ani), valoarea β cross-laps.

6. Suferiți sau ați suferit de vreo boală acută sau cronică?

- DA
- NU

Dacă răspunsul este afirmativ, precizați ce boală (i):

- boli congenitale
- boli profesionale
- boli de inimă
- boli infecțioase
- hepatită virală - B, C, D; HIV; altele
- neoplasme
- alte boli
- boli vasculare - arteriopatie obliterantă; tromboflebită; hipotensiune arterială; hipertensiune arterială; accident vascular cerebral; altele
- boli ale aparatului respirator: astm bronșic emfizem; bronșită cr
- TBC
- boli psihice: depresie; schizofrenie; altele
- boli hepatice: steatoză hepatică; hepatită cronică; ciroză; altele
- diabet: tratament cu insulină; tratament cu antidiabetice oral
- boli digestive: gastrite/ulcer gastro-duodenal; altele
- boli renale - insuficiență renală
- boli endocrine: hipotiroidie; hipertiroidie; altele
- boli reumatismale: poliartrită reumatoidă; colagenoze; altele
- boli scheletale: osteoporoză; altele
- boli neurologice: epilepsie; altele
- manifestări neuro-vegetative: atacuri de panică
- boli hematologice: anemie; talasemie; leucemie acută; leucemie cronică; hemofilie; trombocitopenie; boala von Willebrand; altele

Dacă răspunsul a fost afirmativ, precizați: detalii referitoare la diagnosticul stabilit, precum și tratamentul medicamentos ce v-a fost prescris. În cazul în care ați bifat mai multe afecțiuni, precizați detalii despre fiecare în parte:

7. Ați mai fost supus(ă) unor intervenții chirurgicale?

- DA
- NU

Dacă răspunsul este afirmativ, precizați ce intervenție(i)

Dacă răspunsul este afirmativ, precizați tipul de anestezie:

- loco-regională
- sedare
- generală
- altul

Dacă răspunsul este afirmativ, precizați dacă în timpul sau după intervenția chirurgicală au apărut incidente

- DA
- NU

Dacă răspunsul este afirmativ, precizați ce incidente au aparut

8. Ați primit transfuzii de sânge/derivate:

- DA
- NU

9. Vi s-au mai efectuat tratamente stomatologice?

- DA
- NU

Dacă DA, mi s-au realizat tratamente stomatologice

- fără anestezie
- cu anestezie locală
- cu anestezie locală și sedare inhalatorie
- cu anestezie locală și sedare intravenoasă
- cu anestezie generală

La tratamentele stomatologice anterioare au apărut accidente/incidente sau complicații la utilizarea anesteziei?

- DA
- NU

Au apărut:

- leșin
- greață
- alergii
- altele

10.1. Sunteți/ați fost consumator de tutun

- DA
- NU

10.2. Sunteți/ați fost consumator de alcool

- DA
- NU

10.3. Sunteți/ați fost consumator de droguri

- DA
- NU

Dacă răspunsul este afirmativ, precizați ce cantitate și cât timp ați fumat/fumați; ce cantitate și cât timp ați consumat/consumați alcool și dacă ați avut vreo problemă atunci când nu ați mai consumat alcool; ce drog/droguri utilizați:

11. Sunteți/este posibil să fiți gravidă?

- DA
- NU

Dacă sunteți gravidă, precizați ce vârstă are sarcina (în săptămâni) _____

12. Sunteți în perioada ciclului menstrual?

- DA
- NU

13. Sunteți în perioada de lăuzie/alăptați?

- DA
- NU

Dacă da, care este vârsta copilului:

Certific că am citit și înțeles pe deplin cele de mai sus și declar că datele furnizate de mine în acest chestionar sunt reale și complete. Îmi asum întreaga responsabilitate pentru incidente sau complicații ce pot să apară în eventualitatea că aceste date sunt false sau incomplete.


- CONFIRM
- MAI EXISTA DETALII PE CARE DORESC SĂ LE COMUNIC PERSONAL

TRIMITE

ANEXA 3

CUM SPĂLĂM MÂINILE?

Durata întregii proceduri: cel puțin 30 de secunde!

- | | | |
|--|--|--|
| <p>0</p>  <p>Udați mâinile cu apă.</p> | <p>1</p>  <p>Aplicați săpun suficient pentru a acoperii toată suprafața mâinilor.</p> | <p>2</p>  <p>Frecați mâinile, palmă peste palmă.</p> |
| <p>3</p>  <p>Palma dreaptă peste dosul palmei stângi cu degetele încrucișate și invers.</p> | <p>4</p>  <p>Palmă peste palmă, cu degetele încrucișate.</p> | <p>5</p>  <p>Dosul degetelor pe palma opusă.</p> |
| <p>6</p>  <p>Frecări rotative cu degetul mare stâng prins în palma dreaptă și invers.</p> | <p>7</p>  <p>Frecări rotative într-un sens și celălalt cu degetele împreunate ale mâinii drepte pe palma stângă și invers.</p> | <p>8</p>  <p>Clătiți mâinile cu apă.</p> |
| <p>9</p>  <p>Uscați mâinile cu un prosop de unică folosință.</p> | <p>10</p>  <p>Închideți robinetul folosind un prosop.</p> | <p>11</p>  <p>Odată uscate, procedura de spălare este terminată.</p> |

În conformitate cu recomandările:



World Health Organization



Ministerul Sanatatii



Institutul National de Sanatate Publica

CNEPSS

Centrul National de Evaluare si Promovare a Starii de Sanatate